

Sclérose en plaques

Traitement REBIF®

(Interferon beta 1-A - MERCK SERONO)

Disponible en France depuis 2000



Cette plaquette a été réalisée par la filière SEP de



ASSOCIATION
Neuro-Bretagne

Dans quel cas REBIF[®] est-il utilisé ?

Le REBIF[®] est utilisé chez les patients atteints de sclérose en plaques de forme rémittente (évoluant par poussée).

Comment est-il conservé ?

Au réfrigérateur entre 2 à 8°C mais peut également se conserver à température ambiante pendant 15 jours si la température n'excède pas 25°C. Ne pas oublier de sortir le traitement du réfrigérateur **minimum 30 minutes avant l'injection**.

Comment agit-il ?

Le REBIF[®] est un agent immunomodulateur.

Les immunomodulateurs modifient la façon dont le système de défense de notre corps fonctionne. Le REBIF[®] agit en modifiant les propriétés du système immunitaire pour réduire ses effets nuisibles sur la gaine de myéline et donc diminuer le nombre de poussées et l'évolution de la maladie.

Ce traitement est compatible avec une grossesse et un allaitement

Comment est-il administré ?

Une injection sous cutanée 3 fois par semaine espacé de 48 h minimum

Il est important de choisir des jours fixes pour éviter les oublis.

Exemple de semaine : lundi, mercredi, vendredi.

Pour éviter d'éventuels effets secondaires, le premier mois les doses sont réduites.

Semaines 1 et 2 : **8.8 mcg** (code couleur : vert clair)

Semaines 3 et 4 : **22 mcg** (code couleur : jaune)

À partir de la semaine 5 : **44 mcg** (code couleur : vert foncé)



Que faire avant l'instauration du traitement ?

Votre neurologue s'assurera de :

- La mise à jour du calendrier vaccinal,
- L'initiation du traitement par une IDE d'éducation ou, si elle n'est pas disponible, par une infirmière à domicile,
- L'absence de troubles biologiques,
- L'absence de dépression.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

- Réaction cutanée (rougeur),
- Syndrome pseudo grippal (courbature, fièvre, maux de tête) plus ou moins intense, qui s'atténue avec le temps (possibilité de prendre du Paracétamol avant l'injection pour diminuer ces effets),
- Troubles biologiques (surveillance prise de sang),
- Trouble de l'humeur (humeur plus triste).

Quelle surveillance ?

- Surveillance cutanée des sites d'injections,
- Prises de sang à 1 mois, 3 mois et 6 mois puis annuelles en l'absence de symptômes cliniques,
- Modification de l'humeur.

Que faire en cas d'oubli ?


En cas d'oubli d'une prise, faites l'injection dès que vous vous en rendez compte, **dans un délai maximum de 72 h.**

Schéma des différents sites d'injections

Il existe plusieurs sites d'injection possibles :

- le ventre à droite et à gauche,
- les deux cuisses,
- les deux arrières des bras,

Vous pouvez alterner les sites d'une injection à l'autre.



Ce document est rédigé dans un but pédagogique, avec un langage accessible à tous, pour mémoriser les principales caractéristiques du médicament.

Pour une information complète se reporter à la fiche RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) ou au site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Cette plaquette a été mise à jour en mai 2020.